

سندروم کاوازاکی



واحد آموزش به بیمار
بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر
05/ P.PH.CH.W/ H.A
تاریخ بازنگری: 1402



6 کودک را سال‌یانه عدید
آنفولانزا واکسینه کنید.
کودک خود را در سنین 9 یا
10 جهت ارزیابی قلبی نزد
پزشک ببرید.



در صورت وجود هرگونه سوال
در زمینه بیدماری خود می
توانید همه روزه (به جز
روزهای تعطیل) از ساعت
30:7 تا 13 با کلینیک های
پرستاری آموزش سلامت تماس
بگیرید. تلفن کلینیک
پرستاری: داخلی
(254) 05155238305 در صورت
نیاز به سوال خارج از ساعت
ذکر شده با بخش بستری خود
تماس بگیرید.

نباید در برابر کار های
کودکتان احساس گناه یا خجالت
کنید.

جهت حفظ آرامش کودک محیط آرام
فراهم کنید.

آگاه باشید که پوسته ریزی دست
ها و پاها فاقد درد بوده معمولا
در هفته های دوم و سوم رخ می
دهد.

ممکن است کودک صبح ها در هوای
سرد و بعد از خواب نیمروزی
دچار سفتی بیشتری شود شما می
توانید یا ورزش های غیر فعال
در وان حمام به انعطاف پذیری
کودک خود کمک کنید.

اگر کودک تان تحت درمان با
آسپرین است علائم مسمومیت آن
اعم از وزوز گوش و سردرد و
کبود شدن بدن را بشناسید.

در صورت استفاده از داروی
IVIG به یاد داشته باشید که
تزریق واکسن هایی مثل سرخک،
اوریون و سرخه 5 ماه و واکسن
آبله مرغان را 11 ماه پس از
درمان با **IVIG** برای کودک
استفاده کنید.

2
 کاوازاکی بیماری دورانی کودکی است، این بیماری التهاب حاد است که مخاط، پوست، غدد لنفاوی و عروق قلب را درگیر میکند. بیماری بیشتر در اواخر زمستان یا اوایل بهار مشاهده می شود. دلایل ایجاد بیماری کاوازاکی علت ایجاد بیماری ناشناخته است، احتمال دارد علت بیماری یک عامل عفونی باشد. علائم و نشانه های بیماری چیست؟ تب بالا به مدت 5 روز یا بیشتر اختلال فعالیت عضله قلب تورم غدد لنفاوی گردن و سایر مناطق التهاب بدون ترشح ملتحمه ی هر دو چشم قرمزی و ورم دست ها و پاها حساسیت به نور قرمزی، خشکی و ترک خوردگی لب ها قرمزی دهان و حلق



3
 رمزی زبان (زبان توت فرنگی) راش های قرمز در پشت سینه، شکم یا کشاله ران پوسته ریزی دور ناخن های دست و پا در هفته ی دوم و سوم درمان بیماری چگونه چیست؟ آسپرین تزریق ایمونوگلوبولین (IVIG) پردنیزولون (استروئیدها) بیماران مبتلا به کاوازاکی باید بعد از درمان جهت بررسی های قلبی تحت نظر باشند. بررسی های دراز مدت ممکن است شامل موارد زیر باشد: MRI، نوار قلب دوره ای، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش قلبی. همچنین یک عارضه ی نادر بیماری، ناشنوایی حسی عصبی است. در صورت وجود شک، کودک را باید از نظر شنوایی ارزیابی کرد.

4
 چه اقداماتی بهتر است در رابطه با درمان کودکان مبتلا به کاوازاکی انجام گیرد؟ درجه حرارت بیمار را روزانه کنترل کنید و در صورت تب به پزشک اطلاع دهید. برای پایین آوردن تب کودک و ناراحتی های پوستی، کودک خود را با آب ولرم نشویه کنید. جهت به حداقل رساندن مشکلات پوستی کودک، می توانید از لباس های خنک، نرم و گشاد و لوسیون های بدون بو استفاده کنید. جهت لب های خشک ترک خورده می توانید از کرم های مرطوب کننده استفاده کنید. کودک خود را به مصرف مایعات صاف شده و غذاهای نرم تشویق کنید. از مایعات پر کالری و دارای اسید کمتر استفاده کنید که تحریک کننده نباشد. بهتر است برای دادن مایعات از نی استفاده کنید. باید بدانید که تحریک پذیری نشان های از بیماری است که برای مدت 2 ماه پس از شروع علائم وجود دارد پس