

سپیس یا عفونت خون نوزادان



بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر

واحد آموزش به بیمار

06/P.PH. NICU/H.A

تاریخ بازنگری: 1402

در صورت وجود هرگونه سوال در زمینه بیماری خود می توانید همه روزه (به جز روزهای تعطیل) از ساعت 30:7 تا 13 با کلینیک های پرستاری آموزش سلامت تماس بگیرید. تلفن کلینیک پرستاری: داخلی (254) 05155238305 در صورت نیاز به سوال خارج از ساعت ذکر شده با بخش بستری خود تماس بگیرید.

هشدار ها:

وجود هرگونه عفونت در نوزادان یا شیرخواران در مقایسه با اطفال و بالغین بسیار خطرناک تر خواهد بود. در این گروه ها سیستم ایمنی به خوبی شکل نگرفته است و هنوز توان مقابله با انواع عفونت ها را پیدا نکرده ، همین علت است که گفته می شود باید درمان عفونت نوزادان در بیمارستان صورت گیرد. اگر دچار تب و علایمی شبیه خواب آلودگی، کم اشتها و مشکل تنفسی داشته باشد، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

با آرزوی سلامتی برای فرزند شما

نوزادان مستعد سپیس: نوزادانی که در بخش های ویژه نوزادان بستری میشود مستعد ابتلا به سپیس هستند.

بیشترین علت این بیماری در نوزادان تازه متولد شده ، ورود باکتری ها در طی حاملگی، زایمان و پس از زایمان به داخل بدن نوزاد می باشد. بعضی از حاملگی های پر خطر مانند : خونریزی، تب مادر ، وجود عفونت در رحم یا جفت ، پارگی زودرس کیسه آمنیوتیک ، زایمان سخت و طول کشیده ، باعث افزایش حامله ابتلا نوزاد به سپیس می شوند.



سپسیس یا عفونت خون وضعیتی است که در آن بدن با یک عفونت جدی می‌جنگد، اگر نوزاد شما در وضعیت سپسیس قرار بگیرد، در حالت کاهش فشار خون که به آن شوک می‌گویند خواهد بود. این وضعیت یا بدلیل سیستم های دفاعی بدن یا بدلیل مواد سمی که توسط عوامل عفونی مانند باکتری، ویروس یا قارچ ها ایجاد می‌شود، حاصل می‌گردد. این مشکل در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد اما در شیرخواران کم سن که سیستم ایمنی بدنشان به اندازه کافی رشد نکرده و افرادی با سیستم ایمنی ضعیف مانند افراد مبتلا به ایدز شایع تر است.

سپسیس نوزادی دو نوع دارد: سپسیس اولیه: در هفته اول زندگی دیده می‌شود و اغلب در 24 ساعت اول زندگی تظاهر می‌یابد. عفونت اغلب از مادر گرفته می‌شود. ممکن است بوسیله باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول بارداری، زایمان زودرس، جدایی پرده ها (جفت) که بیش از 24 ساعت طول بکشد، عفونت جفت و مایع آمنیوتیک واژینال در طول زایمان ایجاد شود.

سپسیس ثانویه: نوع دوم بعد از زایمان حاصل می‌شود. ممکن است بوسیله تجهیزات آلوده بیمارستان، در معرض قرار گرفتن دارو هایی که منجر به مقاومت آنتی بیوتیک می‌شوند، ایجاد گردد.

علائم و نشانه ها: بی اشتها و اشکال در غذا یا شیر خوردن. تب یا گاهی پایین آمدن غیر طبیعی دمای بدن. ناتوانی و سستی بدن. لتارژی و گیجی (فرد بی تفاوت می‌شود و نمی‌شنود) کاهش تن صدا مانند گرفتگی صدا.

تغییرات ضربان قلب (تعداد زیاد یا تعداد کمتر از حالت طبیعی) تنفس سریع یا سخت قطع تنفس زردی

تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)

تورم یا برجستگی فونتanel ها در نوزادان (ملاجه)

هر گونه تغییر رفتار که شما را نگران کند.

تشخیص بیماری:

آزمایش خون

کشت خون

آزمایش ادرار

آزمایش و کشت نمونه از

مایع

مغزی - نخاعی

درمان بیماری:

نوزاد مبتلا و یا حتی مشکوک

به سپسیس حتما باید در

بیمارستان بستری

گردد و هر چه سریع تر آنتی

بیوتیک های مورد نیاز از

طریق وریدی تزریق شود.

