

آموزش به پرسنل

داروهای شیمی

درمانی (اگزالیپلاتین)



تاریخ تدوین: 1403/06/24

تاریخ بازنگری: 1404/06/24

کد شناسایی: N003

منبع: بانک اطلاعات داروهای ژنریک

❖ اگزالیپلاتین:

➤ موارد مصرف:

✓ کانسر پیشرفته کولون و رکتوم

➤ تداخلات دارویی:

✓ داروهای نفروتوکسیک (مانند

ادرار آورها، آنتی بیوتیک ها و...):

ممکن است دفع دارو را کاهش

دهند.

➤ عوارض اگزالیپلاتین:

✓ سیستم عصبی مرکزی: گیجی،

خستگی، تب، سردرد، بی خوابی،

درد، نوروپاتی محیطی

✓ سیستم قلبی-عروقی: درد

قفسه سینه، ادم، گرگرفتگی، ادم

محیطی، ترومبوآمبولی

✓ سیستم ادراری: سوزش ادرار،

هماچوری

✓ سیستم گوارشی: درد شکم، بی

اشتهایی، یبوست، اسهال، سوهاضمه،

نفخ، ریفلاکس معده مری، تهوع،

استفراغ، استوماتیت، تغییر چشایی

✓ سیستم خونی: آنمی، نوتروپنی تب

دار، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی

✓ چشم و ENT: اشک ریزش

غیرطبیعی، خونریزی بینی، رینیت،

فارنژیت

✓ سیستم عضلانی- اسکلتی: درد

مفاصل، درد کمر

✓ سیستم تنفسی: سرفه، تنگی

نفس، سکسکه، سمیت ریوی، عفونت

مجاری تنفسی فوقانی

✓ پوست: آلورپسی، واکنش محل تزریق

✓ متابولیک: دهیدراتاسیون،

هیپوکالمی

✓ سایر موارد: سندرم دست و پا،

واکنش آلرژیک

➤ آموزش به بیمار و خانواده:

✓ به بیمار بگویید طی مصرف دارو از مواجهه با سرما یا مواد سرد (نظیر نوشیدنی های سرد یا قطعات یخ) خودداری کند.

✓ به بیمار توصیه کنید طی مصرف دارو لباس های گرم پوشیده و مایعات گرم بنوشد و همه جای بدن خود (دست ها، صورت و سر) را بپوشاند.

✓ بیمار را وادار کنید با پیچیدن شال به دور صورت و دهان هوای گرم استنشاق کند. حتی از دست زدن بدون دستکش به اشیا و غذاهای سرد موجود در فریزر و اشیا موجود در هوای آزاد و سرد خودداری کند.
(چون باعث بدتر شدن علائم نورولوژیک می شود).

✓ به بیمار بگویید در صورت بروز اشکال در تنفس یا شواهد بروز آلرژی به دارو و شواهد عفونت، استفراغ و اسهال مداوم و شواهد دهیدراتاسیون را اطلاع دهد.

توجهات ویژه پرستاری:

✓ دارو نیازی به هیدراسیون پیش از تزریق ندارد.

✓ هرگز برای تهیه دارو، پودر محتوی ویال را با محلول های حاوی کلراید مخلوط نکنید. و از محلول دکستروز واتر 5٪ رقیق استفاده کنید.

✓ در صورت وجود ذرات یا رسوب در سرم تزریقی، آن را دور بیندازید.

✓ قبل از تجویز هرگونه داروی دیگر، لوله تزریق با D5W بشویید.

✓ اگرالیپلاتین و لکوورین را همزمان ولی در بطری سرم های مجزا از طریق سه راهی طی 2 ساعت تزریق کنید و برای جلوگیری از بروز سمیت، زمان انفوزیون را تا 6 ساعت افزایش دهید.

✓ سرسوزن و ظروف حاوی آلومینیم می تواند با دارو واکنش داده و موجب تولید رسوب و کاهش اثربخشی دارو شوند.

✓ ویال های آماده شده تا 24 ساعت در یخچال و پس از رقیق سازی نهایی تا 6 ساعت در دمای اتاق و 24 ساعت در یخچال قابل نگهداری است.

✓ نوروپاتی حاد طی 2 روز روی می دهد و طی 14 روز برطرف می شود. نوروپاتی دائم 14 روز پس از دریافت دارو بروز می کند که می تواند در فعالیت روزمره (نظیر راه رفتن و بلع) اختلال ایجاد کند.